

# TRANSUIN®

Aditivo Melhorador de Desempenho para Suínos em Fase de Terminação.

**INDICAÇÕES DO PRODUTO:** TRANSUIN® é indicado para suínos em fase de terminação proporcionando:

- aumento da deposição muscular;
- redução da deposição de gordura na carne;
- melhoria da conversão alimentar;
- melhoria do rendimento da carcaça;
- aumento da quantidade de carne magra.

**MODO DE USAR:** TRANSUIN® é de uso oral e deve ser usado misturado à ração da fase de terminação dos suínos na proporção de 250 g à 1000 g por tonelada de ração, o que correspondente a 5 ppm à 20 ppm de ractopamina respectivamente. Para garantir uma distribuição homogênea TRANSUIN® na ração final, é recomendável fazer-se uma pré-mistura com milho ou farelo de soja e, posteriormente misturar na ração. É recomendável também que não se misture o produto ao mesmo tempo com óleo vegetal quando este for adicionado à ração.

**INSTRUÇÕES PARA A MISTURA DO TRANSUIN® NA RAÇÃO:** Para se obter uma distribuição homogênea do TRANSUIN® na ração, é recomendável o preparo de uma pré-mistura antes da preparação da ração final. É recomendável ainda que esta pré-mistura contendo TRANSUIN®, na proporção entre 5 e 20 ppm, seja misturada aos demais ingredientes da ração final, que deverá conter no mínimo 0,8% de lisina total.

## **PERÍODO DE RETIRADA (CARÊNCIA):**

A utilização da ração contendo o TRANSUIN® não requer período de carência antes do abate dos animais.

## **RESTRIÇÕES DE USO E PRECAUÇÕES:**

- Não foi avaliado o impacto em suínos destinados a reprodução;
- Não administrar sem diluição na ração final dos suínos;
- Não é destinado ao uso em seres humanos. O cloridrato de ractopamina, ingrediente ativo do TRANSUIN®, é um agonista beta-adrenérgico e portanto pessoas com doenças cardiovasculares devem tomar precauções especiais para evitar a exposição ao produto;
- Ao manusear ou misturar o produto, utilizar equipamentos de proteção individual, tais como roupa protetora, luvas impermeáveis, óculos protetores para os olhos e máscara contra pó;
- Após a manipulação do produto os operadores devem se lavar completamente com água e sabão. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Se ocorrer inalação ou ingestão ou irritação nos olhos procure auxílio médico.

## **NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO**

Cloridrato de Ractopamina.....20,00 g/kg

**COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:** Cloridrato de Ractopamina (2%), Veículo q.s.p (100%).

**MODO DE CONSERVAÇÃO:** Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.